

## Aufgaben 7                      Wellen Wellenträger, Wellengrößen, Sinuswellen, Energie

### Lernziele

- verschiedene Typen von Wellen kennen.
- wissen und verstehen, wie eine Welle entsteht.
- wissen und verstehen, was der Träger einer Welle ist.
- die Bewegungen von Welle und Wellenträger unterscheiden können.
- wissen und verstehen, was eine Quer-/Transversalwelle und eine Längs-/Longitudinalwelle ist.
- wissen, wovon die Geschwindigkeit einer Welle abhängt.
- wissen und verstehen, dass der Wellenträger ein-, zwei oder dreidimensional sein kann.
- wissen und verstehen, was eine Wellenfront ist.
- wissen und verstehen, was eine lineare Welle, gerade Welle, Kreiswelle, ebene Welle und Kugelwelle ist.
- die Zusammenhänge zwischen Periodendauer, Frequenz, Kreisfrequenz, Wellenlänge, Wellenzahl und Ausbreitungsgeschwindigkeit kennen und anwenden können.
- wissen und verstehen, was eine Sinuswelle und eine harmonische Welle ist.
- die mathematische Beschreibung einer eindimensionalen Sinuswelle kennen, verstehen und anwenden können.
- den Träger einer Schallwelle kennen.
- wissen und verstehen, dass Schallwellen in Gasen und Flüssigkeiten Longitudinalwellen sind.
- wissen und verstehen, dass sich in festen Körpern sowohl longitudinale als auch transversale Schallwellen ausbreiten können.
- wissen und verstehen, wie die Energiestromdichte und die Intensität definiert sind.
- den Zusammenhang zwischen der Intensität und der Amplitude einer Schwingungsgröße kennen und anwenden können.
- für eine von einem punktförmigen Sender abgestrahlte Welle den Zusammenhang zwischen der Intensität und dem Abstand vom Sender kennen und verstehen.
- sich aus dem Studium eines schriftlichen Dokumentes neue Kenntnisse und Fähigkeiten erarbeiten können.
- einen neuen Sachverhalt analysieren und beurteilen können.

### Aufgaben

#### 7.1 Vorgängiges Selbststudium

- a) Studieren Sie im Lehrbuch KPK 3 die folgenden Abschnitte:
- Einleitung zum Kapitel "4. Wellen" (Seite 25)
  - 4.1 Der Träger der Wellen (Seite 26)
  - 4.2 Die Geschwindigkeit von Wellen (Seite 27)
  - 4.3 Ein-, zwei- und dreidimensionale Wellenträger (Seite 28)
  - 4.4 Sinuswellen (Seite 29, nur bis 14 Zeilen nach der Formel 4.1, d.h. bis „...vom Ort  $x$  und von der Zeit  $t$ “, und dann wieder ab 7 Zeilen vor der Abb. 4.10, d.h. ab „Gleichung 4.1 beschreibt zunächst ...“, ohne Aufgaben)
  - 4.5 Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Frequenz und Wellenlänge (Seite 30)

Hinweis zum Abschnitt 4.4:

- Wir werden die Formel 4.1 im Unterricht herleiten.

- b) Man unterscheidet bei Wellen zwischen Querwellen/Transversalwellen und Längswellen/Longitudinalwellen. Studieren Sie dazu ...
- i) ... die folgenden **YouTube-Videos**:
    - [Wellenmaschine zur Demonstration von Querwellen](#) (Transversalwelle) (0:27)
    - [Wellenmodell mit Magneten](#) (Longitudinalwelle) (0:15)
    - [Transversalwellen - Wellenmaschine](#) (0:06)
  - ii) ... das folgende **Applet**:
    - [Animation: Ausbreitung von Quer- und Längswellen \(Transversal- und Longitudinalw.\)](#)
- c) Führen Sie in Moodle den [Test 7.1](#) durch.

7.2 Es sind  $T$  die Periodendauer,  $f$  die Frequenz,  $\omega$  die Kreisfrequenz,  $\lambda$  die Wellenlänge,  $k$  die Wellenzahl und  $v$  die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer periodischen Welle. Bestimmen Sie jeweils die fehlenden Größen:

	$T$	$f$	$\omega$	$\lambda$	$k$	$v$
a)	2.00 s			5.00 m		
b)		10.0 Hz			$0.250 \text{ m}^{-1}$	
c)			$10.0 \text{ s}^{-1}$			$20.0 \text{ ms}^{-1}$
d)		440 Hz		77.3 cm		
e)				6'000 km		$3.00 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$
f)		2.4 GHz				$3.00 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$

Hinweise:

- Die Kreisfrequenz  $\omega$  ist wie folgt definiert:  $\omega := 2\pi f$
- Die Wellenzahl  $k$  ist wie folgt definiert:  $k := \frac{2\pi}{\lambda}$

7.3 Eine Sinuswelle läuft entlang eines Seils. Für einen bestimmten Punkt des Seils dauert es 0.170 s, bis er von seiner maximalen Auslenkung zu seiner Mittellage zurückgekehrt ist.

Bestimmen Sie die Periodendauer und die Frequenz der Welle.

7.4 Eine in  $x$ -Richtung fortschreitende, lineare Welle kann mathematisch durch die Funktion  $y$  beschrieben werden:

$$y: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x,t) \mapsto y = y(x,t)$$

$y$  ist eine Funktion mit zwei Variablen. Sie ordnet den beiden reellen Größen  $x$  (Ort) und  $t$  (Zeit) die reelle Grösse  $y$  (Auslenkung) zu. Die Funktion drückt aus, wie gross die Auslenkung  $y$  des Wellenträgers an einem bestimmten Ort  $x$  und zu einem bestimmten Zeitpunkt  $t$  ist.

Erfolgt die Anregung der Welle sinusförmig bzw. harmonisch, ergibt sich eine Sinuswelle bzw. harmonische Welle mit der folgenden Funktionsgleichung (vgl. Unterricht):

$$y(x,t) = \hat{y} \sin(kx - \omega t) \quad \text{wobei: } \hat{y} \quad \text{Amplitude}$$

$$\omega := \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \text{Kreisfrequenz}$$

$$k := \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{Wellenzahl}$$

Gegeben sind die Amplitude  $\hat{y}$ , die Frequenz  $f$  und die Ausbreitungsgeschwindigkeit  $v$ :

$$\hat{y} = 3.0 \text{ cm} \quad f = 2.5 \text{ Hz} \quad v = 50 \text{ cm/s}$$

- a) Bestimmen Sie die Periode  $T$  und die Wellenlänge  $\lambda$ .
- b) Bestimmen Sie die Auslenkung  $y$  am Ort  $x = 42 \text{ cm}$  zum Zeitpunkt  $t = 1.8 \text{ s}$ .
- c) Bestimmen Sie alle Orte  $x$ , an welchen sich zum Zeitpunkt  $t$  ein Wellenberg befindet.
  - i)  $t = 0.0 \text{ s}$
  - ii)  $t = 1.0 \text{ s}$

7.5 In einem als punktförmig betrachteten Sender wird eine harmonische Welle angeregt und ausgesendet. Der Sender sendet also eine in alle Richtungen gleichverteilte Kugelwelle aus. Die Wellenfronten sind Kugeloberflächen.

- a) Beurteilen Sie mit schlüssiger Begründung, ob und wie die Amplitude  $\hat{y}$  und die Intensität  $I$  der Welle vom Abstand  $r$  vom Sender abhängt.  
 (Fortsetzung siehe nächste Seite)

Hinweise:

- Überlegen Sie sich, wie sich die mit der Welle ausbreitende Energie auf dem Wellenträger räumlich verteilt.
- Überlegen Sie sich, ob und wie der Flächeninhalt einer Wellenfront vom Abstand vom Sender abhängt.
- Nehmen Sie an, dass die Welle auf ihrem Weg auf dem Wellenträger keine Energie verliert, d.h. dass keine Energie absorbiert wird.

- b) Bestimmen Sie, um welchen Faktor die Entfernung zum Lautsprecher vergrößert werden müsste, um die Intensität ...
- i) ... auf die Hälfte zu reduzieren.
  - ii) ... auf einen Drittel zu reduzieren.
  - iii) ... auf einen Viertel zu reduzieren.
- c) Die über die Zeit gemittelte Schalleistung sei 100 W. Bestimmen Sie ...
- i) ... die in 60 s abgestrahlte Energie.
  - ii) ... die Intensität der Schallwelle 4.50 m vom Lautsprecher entfernt.

Hinweise:

- Die Schalleistung gibt an, wieviel Energie der Lautsprecher mit der Schallwelle pro Zeiteinheit abstrahlt.
- Die mittlere Schalleistung  $\bar{P}$  ist gleich gross wie die mittlere Energiestromstärke  $\bar{I}_W$  durch eine den Lautsprecher umgebende Kugeloberfläche


7.6 Studieren Sie den folgenden Text zu Erdbebenwellen (Quelle: Metzler Physik\*, Seite 125):

### Erdbebenwellen (seismische Wellen)

Seismik (gr.-lat.) ist die Wissenschaft der Erdbeben. Bei einem Erdbeben entstehen vier Arten seismischer Wellen: Vom Zentrum eines Erdbebens gehen Raumwellen, nämlich *P-Wellen* (Primär-, Longitudinalwellen) und *S-Wellen* (Sekundär-, Transversalwellen) aus. Die longitudinalen P-Wellen durchdringen mit Geschwindigkeiten von bis zu 14 km/s Festkörper und Flüssigkeiten und werden von Seismografen als Erste registriert. Die transversalen S-Wellen können sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 km/s nur durch Festkörper fortpflanzen. Bei einem Beben entstehen außerdem noch Oberflächenwellen, bei denen es sich um *Torsionswellen* oder um Wellen handelt, die *Wasserwellen ähneln* und die nach den Raumwellen eintreffen.

Die Geschwindigkeit der seismischen Wellen hängt von der Elastizität und der Dichte des Materials ab, durch das sie laufen. Aus den unterschiedlichen Zeiten, zu denen sie bei den seismografischen Stationen eintreffen, kann das Epizentrum des Erdbebens lokalisiert werden. Ferner werden die Wellen an Grenzen zweier Medien reflektiert und gebrochen.

Aus dem Verhalten der Wellen ist es möglich, Kenntnisse über den inneren schalenartigen Aufbau der Erde zu gewinnen. Durch Explosionen künstlich erzeugte seismische Wellen werden dazu verwendet, Informationen über unterirdische Gesteinsformationen und Lagerstätten von Erdöl und Erdgas zu gewinnen. Die Wellen werden an den Grenzschichten unterschiedlicher Gesteinsarten reflektiert, von Detektoren registriert. Laufzeiten und Amplituden werden ausgewertet.



Im abgebildeten Seismogramm sind die Wellen eines Erdbebens aufgezeichnet.

Bestimmen Sie mit Hilfe des abgebildeten Seismogrammes und den Angaben im Text die Entfernung des Epizentrums vom Ort des Seismografen.

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Hinweise:

- Nehmen Sie an, dass sich eine Erdbebenwelle (P- bzw. S-Welle) auf ihrem ganzen Weg mit einer konstanten Geschwindigkeit ausbreitet.
- Verwenden Sie für die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Erdbebenwellen die im Text angegebenen Maximalgeschwindigkeiten.
- Formulieren Sie für beide Erdbebenwellen den aus der Kinematik bekannten Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Zeit (Zeitspanne, Laufzeit) und Weg.
- Der Unterschied zwischen den Laufzeiten der P- und S-Welle kann aus dem Seismogramm herausgelesen werden.

\*Grehn, J., Krause, J. (Hrsg.): Metzler Physik, Schroedel, Hannover 1998, 3. Auflage, ISBN 3-507-10700-7