Aufgaben 10 Funktionstypen Trigonometrische Funktionen und Gleichungen, Arkusfunktionen

Lernziele

- den Einfluss einer Verschiebung, Skalierung auf die Amplitude, Periode und Phasenverschiebung einer trigonometrischen Funktion kennen und verstehen.
- die Amplitude, Periode und Phasenverschiebung einer trigonometrischen Funktion bestimmen können.
- den Grafen einer einfacheren trigonometrischen Funktion skizzieren können.
- die Lösungen einer einfacheren trigonometrischen Gleichung von Hand bestimmen können.
- die Umkehrfunktion einer einfacheren trigonometrischen Funktion bestimmen können.

Aufgaben

10.1 Betrachten Sie die einfachstmögliche Sinus-Funktion f und die aus ihr abgeleiteten Funktionen f_1 , f_2 , f_3 , f_4 und f_5 :

```
f: R
          R, x y = f(x) = \sin(x)
           R, x y = f_1(x) := \sin(x+b)
f_1: R
                                                                   (b R\setminus\{0\})
           R, x y = f_2(x) := \sin(x) + c
f<sub>2</sub>: R
                                                                   (c R \setminus \{0\})
f<sub>3</sub>: R
           R, x y = f_3(x) := \sin(a \cdot x)
                                                                   (a R^+ \setminus \{1\})
f<sub>4</sub>: R
           R, x y = f_4(x) := A \cdot \sin(x)
                                                                   (A R^+\setminus\{1\})
f5: R
           R, x
                    y = f_5(x) := A \cdot \sin(ax+b)
                                                                   (A R^{+}\setminus\{1\}, a R^{+}\setminus\{1\}, b R\setminus\{0\})
```

- a) Skizzieren Sie ins gleiche Koordinatensystem die Grafen von
 - i) f und f_1 Unterscheiden Sie dabei die beiden Fälle b>0 und b<0.
 - ii) f und f_2 Unterscheiden Sie dabei die beiden Fälle c>0 und c<0.
 - iii) f und f_3 Unterscheiden Sie dabei die beiden Fälle a>1 und 0 < a < 1.
 - iv) f und f_4 Unterscheiden Sie dabei die beiden Fälle A>1 und 0<A<1.
 - v) f und f₅ für den Fall A>1, a>1, b<0.
- b) Geben Sie für alle Funktionen $f, f_1, ..., f_5$ die Amplitude A, die Periode p und die Phasenverschiebung x_0 an.
- 10.2 Papula 1: 318/5 (303/5), 318/6 (303/6), 318/4 (303/4)
- 10.3 Bestimmen Sie alle Lösungen der folgenden trigonometrischen Gleichungen:
 - a) $\sin(x) = a$ (-1 a 1)
 - b) cos(x) = b (-1 b 1)
 - c) tan(x) = c (c R)
 - d) cot(x) = d (d R)
- 10.4 Papula 1: 320/16 (305/16)

- 10.5 Bearbeiten Sie für die beiden Funktionen in der Aufgabe 318/6 (303/6) im Buch Papula 1 die folgenden Teilaufgaben:
 - i) Bestimmen Sie für den Definitionsbereich A und den Zielbereich B "grösstmögliche" Teilmengen von R, so dass die Funktion bijektiv wird.
 - ii) Skizzieren Sie den Grafen der bijektiven Funktion.
 - iii) Bestimmen Sie die Umkehrfunktion.
 - iv) Skizzieren Sie den Grafen der Umkehrfunktion.

Lösungen

b) f:
$$A = 1$$
 $p = 2$ $x_0 = 0$ f_1 : $A = 1$ $p = 2$ $x_0 = -b$

$$f_2$$
: $A = 1$ $p = 2$ $x_0 = 0$

$$f_3$$
: $A = 1$ $p = \frac{2}{a}$ $x_0 = 0$

$$f_4$$
: $A = A$ $p = 2$ $x_0 = 0$

$$f_5$$
: $A = A$ $p = \frac{2}{a}$ $x_0 = -\frac{b}{a}$

10.2 siehe Papula 1

10.3 a)
$$\begin{aligned} x_{1k} &= \arcsin(a) + k \cdot 2 \quad (k \quad Z) \\ x_{2k} &= -\arcsin(a) + k \cdot 2 \quad (k \quad Z) \end{aligned}$$

b)
$$x_{1k} = \arccos(b) + k \cdot 2$$
 (k Z)
 $x_{2k} = -\arccos(b) + k \cdot 2$ (k Z)

c)
$$x_k = \arctan(c) + k \cdot (k \ Z)$$

d)
$$x_k = \operatorname{arccot}(d) + k \cdot (k \ Z)$$

10.4 siehe Papula 1

10.5 a) i)
$$A = \left\{ x \mid -\frac{2}{3} - \frac{2}{6} \quad x \quad -\frac{2}{3} + \frac{2}{6} \right\}$$
 $B = \{y \mid R \mid -4 \mid y \mid 4\}$

iii)
$$f^{-1}$$
: B A, x $y = f^{-1}(x) = \frac{1}{3} \arcsin(\frac{x}{4}) - 2$

b) i)
$$A = \left\{ x \mid -\frac{1}{2} \mid x \mid 0 \right\}$$
 $B = \{y \mid R \mid -2 \mid y \mid 2\}$

iii)
$$f^{-1}$$
: B A, x $y = f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \arccos(\frac{x}{2}) +$